



Dokumenttyp Rutin	Version	Dokumentet gäller för Sjuksköterska, Vård- och omsorgspersonal	Datum för fastställande 2020-10-27
Revideringsansvarig MAS		Revideringsintervall Varje år och vid behov	Reviderad datum 2022-06-02
Dokumentansvarig MAS, EC Hemsjukvård egen regi		Uppföljningsansvarig och tidplan MAS	

## Rutin för delegering av läkemedel mot smärta/oro via injektion med förfylld spruta i kvarliggande subkutans nål.

Ex. Morfin, Midazolam, Haldol

### Grund för utfärdande av delegeringen

Delegering av subcutan (s.c) injektion kan förekomma i de fall förväntad inställetid för sjuksköterska kan påverka en patients möjlighet att få bästa möjliga lindring av smärta, oro, illamående eller ångest.

Delegeringen ska vara patientsäker, restriktiv och vara patientbunden och får endast utfärdas till ett fåtal undersköterskor per patient.

Delegeringen kan utfärdas av patientansvarig eller tjänstgörande sjuksköterska. Nattpersonal delegeras av natt-ssk

### Mottagare av delegering

Personal som kan vara aktuell för delegering ska vara väl känd av delegerande sjuksköterska.

Aktuell personal ska vara trygg i att ta emot denna specialdelegering.

Personal ska vara väl informerad om att insatsen endast får utföras **efter** kontakt med tjänstgörande sjuksköterska.

Delegering ska vara skriftlig eller utföras i Appva. Om det utförs skriftligt ska ett ex ges till undersköterskan, och ett ex till delegerande sjuksköterska

Delegeringen är bunden till namngiven patient.

Delegeringen ska avslutas direkt när behov inte längre finns.

Personal som kan vara aktuell för delegeringen är: den som sitter vak, undersköterska i hemtjänst för aktuellt område, undersköterska på särskilt boende, nattpatrullens undersköterska.

**Tillvägagångssätt:**

Tjänstgörande sjuksköterska färdigställer läkemedel i spruta enligt ordination samt märker sprutan med vilket preparat det är, samt tid, datum och signatur vid sitt besök hos patienten. Sjuksköterskan som färdigställer sprutan avgör hur många doser som ska förberedas, rimligtvis det som kan behöva att ges t.ex. under natten.

I samband med detta görs uttag i Appva med signeringsvalet ”Medskickad”

Sprutan försluts med propp och ska vara tydligt märkt med – Personuppgifter, innehåll/läkemedel, datum och tid, vem som iordningsställt dosen. Uppdragen spruta hållbar 24 tim.

Sprutan ska förvaras i patientens medicinskåp. Olika preparat ska förvaras väl åtskilda så förväxling inte sker.

Patienten ska ha kvarliggande s.c. nål, s.k. Neoflon i vilken injektionen ges.

**Den personal som ska utföra insatsen ska:**

Vara lyhörd för patientens egna uttryck för smärta

Smärtskatta patienten enligt skattningsskala.

Kontakta tjänstgörande sjuksköterska.

Ge injektionen enligt ordination. Detta dokumenteras av ssk i Combine samt av personal i Intraphone

Följa och utvärdera effekten samt rapportera detta tillbaka till tjänstgörande ssk.

**Sjuksköterskan som tjänstgör ska:**

Om symtomen är svåra att tolka eller givna doser inte får avsedd effekt ska tjänstgörande ssk göra ett hembesök för bedömning.

Tjänstgörande ssk som tjänstgör nästa dagpass besöker och följer upp patientens status